

陳樹渠紀念中學

Chan Shu Kui Memorial School

COPY

學校通告編號：S14/15 ~ 076

提高警覺 預防急性腸胃炎

敬啟者：根據衛生署衛生防護中心的數據顯示近兩星期的急性腸胃炎爆發報告上升，爆發數字由之前數月的每周錄得 0 至 3 宗上升至第 44 周(2014 年 10 月 26 日至 11 月 1 日) 錄得五宗及第 45 周首 5 日(2014 年 11 月 2 日至 11 月 6 日) 錄得六宗爆發。此外，定點普通科診所監測數據亦顯示急性腸道傳染病求診率有所上升。定點普通科診所每周的急性腸道傳染病求診率(每千名求診個案)由 3.9 (2014 年 10 月 19 至 25 日)上升至 4.5 (2014 年 10 月 26 日至 11 月 1 日)。

諾如病毒及輪狀病毒是最常引致急性腸胃炎的病原體，可透過進食受污染的食物、直接接觸患者的嘔吐物或排泄物、接觸受污染的物品或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。感染的徵狀包括惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒及疲倦。患者一般可自行痊癒。由於病毒具高傳染性，有可能導致難以控制的疾病爆發。它是最常引致院舍爆發。這些爆發全年都有機會發生，但較常見於冬季月份。

要預防急性腸胃炎在院舍內爆發，應加緊注重個人、食物及環境衛生，特別要小心處理嘔吐物及排泄物。中心建議採取以下措施：

1. 提醒學生保持個人衛生，尤其是進食前及如廁後應用梘液徹底清潔雙手。
2. 提醒學生保持食物衛生。確保所有食物尤其是貝殼類海產應徹底煮熟。
3. 提醒學生在使用噴射式飲水器時應注意以下事項：
 - 使用噴射式飲水器飲用食水時，身體不應與噴水口防護裝置有直接接觸；
 - 嚴禁吐痰在飲水器內。
4. 患病學生應該放病假，直至腹瀉或嘔吐停止最少兩天後，或按醫生建議為準。以防止疾病蔓延。

我們再次籲請各位家長通力合作，保持家居清潔衛生，並時刻提醒 貴子弟注意個人衛生，做好一切預防傳染病的措施。

有關預防傳染病的預防和控制措施的實用資料，可在以下網站瀏覽：
<http://www.chp.gov.hk/tc/content/9/460/24522.html>

此致

貴家長



2014 年 11 月 11 日

林宛君校長 啓